



新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

問 保健センター(☎82-8211)

※10月13日(木)時点の情報です。最新の情報は市ホームページ等をご確認ください。

これまでの2年間をみると、年末年始に新型コロナウイルス感染症が感染拡大しています。2022年の年末までには、重症化リスクの高い高齢者はもとより、若い人にもワクチン接種を完了するよう推奨します。

オミクロン株対応2価ワクチンについて

初回接種(1・2回目)接種を終えた12歳以上の市民を対象として、「オミクロン株対応ワクチン(BA.1)」の追加接種を令和4年10月から実施していましたが、10月23日(日)で一旦終了し、10月24日(月)から「オミクロン株対応ワクチン(BA.4/5)」に切り替えて接種を実施しています。海外の動向等をふまえ、接種間隔が5か月から3か月に短縮される予定です。接種券発送スケジュール等の詳細は市ホームページをご確認ください。



▲市ホームページ

オミクロン株対応2価ワクチンの効果について

オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種には、オミクロン株の成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果それぞれに寄与する免疫をより強く誘導します。そのため、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。

異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。そのため、今後の変異株に対して有効である可能性がより高いことが期待されています。

オミクロン株対応2価ワクチンの安全性について

ファイザー社およびモデルナ社の2価ワクチンの薬事承認において、どちらのワクチンも従来型ワクチンとおおむね同様の症状がみられました。

発現割合	症状	
	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	注射部位疼痛	注射部位疼痛、疲労
10～50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心、嘔吐
1～10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑、発赤、腫脹、硬結、発熱

インフルエンザワクチンとの接種間隔について

新型コロナウイルスワクチンは、インフルエンザワクチンとの接種間隔の規定がなくなったため、同時接種も可能となりました。接種については主治医とご相談ください。

初回(1・2回目)接種について

新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は令和5年3月31日までとされています。接種間隔が3か月に短縮となった場合、オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する人は、令和4年12月末までに1, 2回目接種を完了する必要がありますのでご注意ください。

知立市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター

☎0566-93-3320

月曜日～土曜日(祝日除く) 午前9時から午後5時

【対応言語】日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語

